


### Canard de Meller (2012)

*Anas melleri* (Sclater, 1865)

Meller's Duck

**Statut de conservation – UICN**



**Statut en élevage**

Très peu élevé, car difficile à placer du fait qu'il soit moins coloré que d'autres espèces

**Statut juridique**

Classée en annexe D du règlement 338/97, non aux 2 arrêtés du 10 août 2004

**Détention en élevage**


Détention libre

**Diamètre de bague**

11 mm


**Description**

De couleur foncée, gris-brun, avec un fin liseré blanc sur les plumes du dessus, qui devient un peu plus large sur la poitrine et le dessous. La tête est davantage gris foncé que brune. Le miroir alaire est vert émeraude avec une bande sous-terminale noire et un fin liseré blanc. Les couvertures sous-alaires sont presque blanches. Le bec est bleu-gris et, rapporté au corps, il est très long et fin.



**Distribution :** Madagascar.

**Habitat naturel :** Zones humides terrestres : rivières, lacs eau douce, mares/marais eau douce, terrains agricoles.



**Reproduction**

**Maturité sexuelle :** 1 an  
**Type de nid :** Nid au sol dans la végétation près de l'eau  
**Saison de ponte :** Fin avril début mai  
**Nombre d'œufs pondus :** 5 à 13 œufs – 2<sup>ème</sup> ponte  
**Incubation :** 26-28 jours assurés par la femelle seule  
**Couleur, taille et poids de l'œuf :** Blanc – ND – ND