



CASAES



Conservatoire Avioernis des Souches d'Anatidés Ex-Situ

Dendrocygne à lunules (2012)

<i>Dendrocygna arcuata</i> (Horsfield, 1824)		Wandering Whistling Duck
Statut de conservation – UICN		<p>Eteint Menacé Préoccup. min.</p> <p>EX EW CR EN VU NT LC</p> <p>LC : Préoccupation mineure</p>
Statut en élevage		Faible représentation
Statut juridique		Espèce ne figurant ni à la CITES, ni au règlement européen 338/97, ni aux 2 arrêtés du 10 août 2004
Détention en élevage		Détention libre
Diamètre de bague		9 mm
Description	<p>Le dendrocygne à lunules mesure entre 40 et 45 cm. Le plumage est un brun clair sur la tête et le cou avec une calotte sombre descendant jusqu'au niveau des yeux et des taches pectorales noires. Le dessous est roussâtre avec des marques blanches et noires sur les flancs très nettes, les ailes sont plus foncées et le croupion est blanc bordé de crème.</p> <p>Le juvénile présente un plumage plus terne avec des couvertures sus-alaires moins brunes et le milieu du ventre plus clair.</p>	
Distribution : Indonésie, Philippines, Nouvelle-Guinée et dans le nord et l'est de l'Australie.		<p>■ résident</p>
Habitat naturel : Lagunes, marais et milieux dégagés où l'eau est profonde et la végétation émergée assez abondante, dans les prairies inondées, les champs de chaume, les pâturages, les terres irriguées et les rizières.		
Reproduction	<p>Maturité sexuelle : 2 ans et plus Type de nid : Niche au sol dans la végétation Saison de ponte : Mai à mi-septembre Nombre d'œufs pondus : 7 à 15 œufs – 2^{ème} ponte Incubation : 28-30 jours assurés par les deux parents Couleur, taille et poids de l'œuf : Blanc crème – 53 x 37 mm – 40 g</p>	