




### Erismature à tête blanche (2011)

<i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, 1769)		White-headed Duck
<b>Statut de conservation – UICN</b>		<p>Eteint                      Menacé                      Préoccup. min.</p> <p>EX EW CR <b>EN</b> VU NT LC</p> <p>EN A2bcde+4bcde : En danger</p>
<b>Statut en élevage</b>		Espèce rare en élevage
<b>Statut juridique</b>		Classée en annexe A du règlement 338/97, mais annexe X si née et élevée en captivité
<b>Détention en élevage</b>		Détention libre
<b>Diamètre de bague</b>		10 mm
<b>Description</b>	<p>Une grosse tête blanche surmontée d'une calotte noire et une silhouette trapue, un gros bec bleu dont la base est renflée. Tête blanche et corps brun, un anneau de plumes foncées sépare les 2. La couleur du plumage varie du brun au roux .</p>	<p>♂</p>  <p>Photo : Thierry Clercx</p>
		<p>♀</p>  <p>Photo : Michel Fromentin</p>
<b>Distribution</b> : Sud de l'Espagne, Sardaigne, ex-Yougoslavie, Turquie, et Algérie.		 <p> <span style="color: green;">■</span> résident    <span style="color: yellow;">■</span> nidification    <span style="color: blue;">■</span> hors nidification  <span style="color: brown;">■</span> passage    <span style="color: red;">■</span> incertain </p>
<b>Habitat naturel</b> : Petits lacs d'eau douce, grands réservoirs aux eaux saumâtres, bordés de roselières riveraines fourniees.		
<b>Reproduction</b>	<p><b>Maturité sexuelle</b> : 1 an  <b>Type de nid</b> : Dans les herbes de bordure d'eau  <b>Saison de ponte</b> : Avril à fin août  <b>Nombre d'œufs pondus</b> : 5 à 8 œufs – 2<sup>ème</sup> ponte  <b>Incubation</b> : 23 à 26 jours assurés par la femelle seule  <b>Couleur, taille et poids de l'œuf</b> : Verdâtre, bleuâtre – 67 x 41 mm – 88 g</p>	