



CASAES




Conservatoire Avionis des Souches d'Anatidés Ex-Situ

Milouin à dos blanc ou Fuligule à dos blanc (2012)

Aythya valisineria (Wilson, 1814)

Canvasback

Statut de conservation – UICN



Statut en élevage

Peu représenté

Statut juridique

Espèce ne figurant ni à la CITES, ni au règlement européen 338/97, ni aux 2 arrêtés du 10 août 2004

Détention en élevage

Détention libre

Diamètre de bague

11 mm


Description

Mâle tête et cou marron roux, poitrine et manteau intérieur noirs, dos vermiculé de gris clair. Femelle : tête, cou et poitrine bruns. Lores, gorge et ligne en arrière de l'œil plus pâles, jaunâtres ou blanchâtres.



Distribution : Amérique du Nord.

Habitat naturel : Zones humides terrestres, tourbières, lacs eau douce. Milieu marin, zone côtière, littoral et eaux saumâtres, marais salants et lacs marins.



Reproduction

Maturité sexuelle : 2 ans

Type de nid : A partir de végétaux (plutôt grossièrement recouvert de duvet) niche quasi toujours au sol

Saison de ponte : A partir de février

Nombre d'œufs pondus : 8 à 10 œufs

Incubation : 23 à 29 jours assurés par la femelle seule

Couleur, taille et poids de l'œuf : Gris-vert – 63 x 44 mm – 63 g