


### Nyroca de Baer ou Fuligule de Baer (2015)

*Aythya baeri* (Radde, 1863)

Baer's Pochard

**Statut de conservation – UICN**



CR A2cd+3cd+4cd : En danger critique d'extinction

**Statut en élevage**

Peu représenté

**Statut juridique**

Espèce ne figurant ni à la CITES, ni au règlement européen 338/97, ni aux 2 arrêtés du 10 août 2004

**Détention en élevage**


Détention libre

**Diamètre de bague**


10 mm

**Description**

Sa tête est marquée de reflets verts, sa poitrine est rousse lavée de violacé et ses flancs roussâtres sont largement marqués de blanc crème. Son bec est plus clair que celui des autres espèces.



**Distribution :** Eurasie, en Asie du Sud-Est et en Chine.



**Habitat naturel :** Zones humides terrestres : lacs eau douce, mares/marais eau douce.

**Reproduction**

**Maturité sexuelle :** 1 an

**Type de nidhoir :** Nidhoir classique ou végétation dense

**Saison de ponte :** Mi-mai à juillet

**Nombre d'œufs pondus :** 8 à 10 œufs – 2<sup>ème</sup> ponte

**Incubation :** 27 jours assurés par la femelle seule

**Couleur, taille et poids de l'œuf :** Brun jaunâtre – 52 x 39 mm – 43 g