



CASAES



Conservatoire Avionis des Souches d'Anatidés Ex-Situ

Sarcelle à collier (2012)

<i>Callonetta leucophrys</i> (Vieillot, 1816)		Ringed Teal
Statut de conservation – UICN		<p>Eteint Menacé Préoccup. min.</p> <p>EX EW CR EN VU NT LC</p> <p>LC : Préoccupation mineure</p>
Statut en élevage		Très courante
Statut juridique		Espèce ne figurant ni à la CITES, ni au Règlement Européen 338/97, ni aux 2 arrêtés du 10 août 2004
Détention en élevage		Détention libre
Diamètre de bague		8 mm
Description	<p>Mâle : tête et dessous clairs, poitrine rose, tachetée, calotte et centre de la nuque foncés, région anale noire et blanche.</p> <p>Femelle : brune, plus foncée dessus, joues barrées de blanc. Les ailes sont noirâtres avec des zones blanches sur la face supérieure.</p>	<p>Photo : Thierry Clercx</p>
Distribution : Amérique du Sud : Argentine, Brésil, Bolivie, Paraguay et Uruguay.	<p>■ résident</p>	
Habitat naturel : Etangs et marais des régions boisées. Surtout dans les plaines inondées saisonnièrement.		
Reproduction	<p>Maturité sexuelle : 1 an</p> <p>Type de nid : Perché, type nid à chicane, tronc creux, plus rarement graminées denses</p> <p>Saison de ponte : Mars à juillet (voire des pontes automnales)</p> <p>Nombre d'œufs pondus : 6 à 12 œufs – 2^{ème} ponte voire plus</p> <p>Incubation : 26 à 27 jours assurés par la femelle</p> <p>Couleur, taille et poids de l'œuf : Blanc – 47 x 33 mm – 32 g</p>	