



# CASAES




## Conservatoire Avioernis des Souches d'Anatidés Ex-Situ

### Sarcelle châtaine (2012)

*Anas castanea* (Eyton, 1838)

Chestnut Teal

**Statut de conservation – UICN**



**Statut en élevage**

Très peu représentée

**Statut juridique**

Espèce ne figurant ni à la CITES, ni au règlement européen 338/97, ni aux 2 arrêtés du 10 août 2004

**Détention en élevage**


Détention libre

**Diamètre de bague**


9 mm

**Description**

Les sarcelles rousses doivent leur nom à la livrée nuptiale de couleur châtain roux du mâle. Les mâles qui ont assuré avec succès la reproduction, troquent leur livrée nuptiale lors de la mue pour un plumage d'éclipse, ce qui n'est généralement pas le cas chez les mâles non accouplés. Les mâles et femelles ont un plumage différent. La femelle présente un plumage brun sombre. Les plumes ont un centre foncé et des liserés jaunâtres pâles.



**Distribution :** Sud de l'Australie et Tasmanie.



**Habitat naturel :** Eau douce, eau salée. Marais côtiers et lagunes, marais de mangrove.

**Reproduction**

**Maturité sexuelle :** 1 an

**Type de nid :** Nid classique où à chicane, au sol dans de la végétation bordière

**Saison de ponte :** Mars à octobre

**Nombre d'œufs pondus :** 8 à 12 œufs - 2<sup>ème</sup> ponte

**Incubation :** 23 - 28 jours assurés par la femelle seule

**Couleur, taille et poids de l'œuf :** Crème clair – 52 x 37 mm – 40 g