






CASAES



Conservatoire Avionis des Souches d'Anatidés Ex-Situ

Sarcelle d'été (2011)

<i>Anas querquedula</i> (Linnaeus, 1758)		Garganey
Statut de conservation – UICN		<p>Eteint Menacé Préoccup. min.</p> <p> </p> <p>LC : Préoccupation mineure</p>
Statut en élevage		Bien présente dans nos élevages, mais en diminution
Statut juridique		Classée en annexe A du règlement 338/97, mais annexe X si née et élevée en captivité (...), et chassable en France
Détention en élevage		Détention libre
Diamètre de bague		7 mm
Description	<p>Mâle : calotte et nuque noirâtres, large et long sourcil blanc. Joux et cou brun rougeâtre. Poitrine et corps brun clair écaillés de noir. Femelle : calotte, nuque et trait oculaire foncés. Poitrine, flancs, dessus et bas ventre jaunâtre terne.</p>	 <p>♂</p> <p>Photo : Thierry Clercx</p>  <p>♀</p> <p>Photo : Liliane De Boeck</p>
Distribution : Europe et Asie, hiverne dans le nord des tropiques.		 <p> ■ nidification ■ passage ■ hors nidification </p>
Habitat naturel : Etangs, lacs et marais d'eau douce peu profonds, avec une végétation de bordure dense.		
Reproduction	<p>Maturité sexuelle : 1 an Type de nid : Nid à chicane Saison de ponte : Avril à juin Nombre d'œufs pondus : 8 à 11 œufs – 2^{ème} ponte Incubation : 22 jours assurés par la femelle seule Couleur, taille et poids de l'œuf : Jaune pâle à coloré – 46 x 33 mm – 28 g</p>	