




CASAES

Conservatoire Aviornis des Souches d'Anatidés Ex-Situ

Siffleur d'Amérique ou Canard à front blanc (2014)

<i>Anas americana</i> (Gmelin, 1789)	American Wigeon	
Statut de conservation – IUCN	Eteint EX EW CR EN VU NT LC LC : Préoccupation mineure	
Statut en élevage	Pas beaucoup représenté	
Statut juridique	Espèce ne figurant ni à la CITES, ni au règlement européen 338/97, repris aux 2 arrêtés du 10 août 2004 et arrêté Guyane	
Détention en élevage	APD	
Diamètre de bague	10 mm	
Description	Le mâle est reconnaissable grâce à son front et sa bande crânienne blanche. Une bande vert foncé va de l'arrière de l'œil sur les côtés de la tête jusque dans la nuque. Les joues et le haut du cou sont pointillés de gris. La poitrine et les flancs sont brun rosé, l'arrière du corps blanc et noir et le ventre blanchâtre. Les femelles sont brun-roux.	  Photos : Guillaume Coat
Distribution : Amérique du Nord.		
Habitat naturel : Zones lacustres, les marais d'eau douce, les fleuves, les lacs et les régions agricoles bordant le littoral.		
Reproduction	Maturité sexuelle : 1 an Type de nichoir : Dans la végétation dense ou nichoir chicane Saison de ponte : Mai à juin Nombre d'œufs pondus : 6 à 12 œufs – 2 ^{ème} ponte Incubation : 24 à 25 jours assurés par la femelle seule Couleur, taille et poids de l'œuf : Blanc crème - 54 x 38 mm - 43 g	